

☐

I'm not robot


reCAPTCHA

Continue

Anemia fisiológica de embarazo



PLAN DE CIUDADOS DE ENFERMERIA				
Dominió: 3 eliminación e intercambio	Clase: 2 función gastrintestinal	Dominió: salud fisiológica II Clase: eliminación		
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA)	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACI N DANA
Etiquetas (problemas) [a]				
Estreñimiento [00011]	Eliminación intestinal [0501]	Facilidad de eliminación de las heces [050112]	1. Gravemente comprometido	Mantener en 3 Aumentar a 5
Factores relacionados (causas)			2. Sustancialmente comprometido	
Embarazo			3. Moderadamente comprometido	
Características de defecatorias (signos y síntomas)			4. Levemente comprometido	
Esfuerzo con la defecación incapacidad para eliminar las heces			5. No comprometido	

INTERVENCIONES (NIC)	FUNDAMENTACIÓN
MANEJO DEL ESTRÉS/EMERGENCIA/IMPACTACIÓN (R450) Actividades: - Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos y fibras. - Fomentar el ejercicio (ambulación) - Enseñar al paciente / familia que registre el color, volumen, frecuencia y consistencia de las deposiciones. - Instruir al paciente / familia acerca de la dieta rica en fibra. - Consejar al paciente a consultar con su médico si el estreñimiento persiste después del embarazo. Referencias bibliográficas: Teitel, J. Heather, Merdman, PhD, RN, "NANDA INTERNATIONAL. DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 2009-2011. Editorial Elsevier Edithors: Moorhead, PhD, RN, Johnson, Maryann, PhD, RN, Maas Merkle, RN, RN, FAAN, Swanson, Elizabeth, PhD, RN, "CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC) 4ª Edición. Editorial: Elsevier. Edithors: M. Kathleen Gloria, PhD, RN, FAAN, J. Butcher, Inward, PhD, RN, APRN, BC, McCloskey Doolittle, Jeanne, PhD, RN, FAAN, "CLASIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (NIC) 5ª Edición. Editorial: Elsevier. Participantes:	Lograr la capacidad de eliminación de las heces de nuestro paciente para un mejor confort gastrointestinal, físico y disminución de náuseas.


Elaboró: RAYÓN RUEDA ESTELA

DIAGNOSTICO

- Historia familiar: antecedentes de enfermedades generales y hematológicas, presencia de anemia, ictericia, cálculos biliares.
- Antecedentes obstétricos: embarazo, tipo de parto, medicamentos, infecciones.
- Examen físico: mala perfusión, shock, acidosis (perdida aguda de sangre) , palidez, irritabilidad, dificultad respiratoria (perdida crónica de sangre), ictericia, palidez, hepatoesplenomegalia en caso de hemólisis.



Anemia Fisiológica



In útero, la saturación de oxígeno en la sangre fetal es de 45%, los niveles de bilirrubina son elevados. Después del nacimiento la saturación de oxígeno es de 95% y la bilirrubina es indetectable.

Anemia por deficiencia de hierro tratamientos. Anemia fisiológica del embarazo. Como son los primeros meses de embarazo.

[illegible]

[illegible]